



Randomisert kontrollert studie av en skoleintervensjon i Niger

Studien


- Samarbeid Strømmestiftelsen.
- Hovedmål: Å se om et akselerert skoleprogram for eldre barn som hadde droppet ut eller ikke begynt på skolen kunne hjelpe dem tilbake inn i det ordinære skolesystemet.
- Delmål: Å se om randomisering til studien reduserte andelen tidlige ekteskap.
- 30 landsbyer ble randomisert til treatment landsbyer, og fikk en skole.
- Barn fra listene der ble randomisert til en treatgruppe og en «kontroll-i-treat» gruppe.
- I de 60 kontrollandsbyene ble barn fra listene trukket til en «kontroll-i-kontroll» gruppe.
- Totalt er 3,216 barn med i de tre gruppene.

Tøff målgruppe


- Niger er verdens fattigste land, landsbygda er enda fattigere.
- Barna hadde droppet ut av grunnskolen, eller hadde aldri begynt.

Alderen; fom 12-14 og tom 14-16 år omfatter pubertet, rask fysisk vekst og økende autonomi:

- Foreldrene har mindre autoritet.
- Alternativkostnadene til skole øker med arbeidsdyktighet.
- Ekteskap i aldersgruppen en vanlig, og har en viss prestisje.
- Jevnaldrende migrerer og kommer hjem med penger.




Utvikling for barna 2018-2021




Tidlige ekteskap

Prosentandel jenter gift
i 2020.




Barne- fødsler

Prosentandel jenter
mødre i 2020.



Lærdom: Denne typen forskningsdesign forstyrrer i vesentlig grad de prosjektmodellene vi evaluerer, og irriterer lokalsamfunnene



- Akademikere og NGOer har ulik identitet og ulike roller i lokalsamfunnene.

NGOene har noe å gi - vi bare tar (tid, tillit). NGOene kan kreve mer – og folk har forventninger til dem. Vi må opptre med en annen ydmykhet.

- Fordeler:

Prosjektdeltakere i tilsvarende «suksessprosjekter» rekrutterer gjerne de mest ressurssterke.

Vi randomiste fra nær alle barn, så utvalget er representativt for alle out-of-school barn.

Vi kan generalisere våre funn til hele out-of-school befolkningen, det er ikke vanlig.

- Ulemper:

Bare store landsbyer (nok 12-14 åringer for både en treatment og en kontrollgruppe).

Søsken, barn av kone nummer to, og bestevenner ble splittet v/randomisering.

Ingen mulighet til å erstatte de som ikke innruller eller dropper ut tidlig.

